

TOJÁS KISOKOS

AMIT A TOJÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES

A HÜLLŐK TÖBBSÉGE, A MADARAK ÉS AZ EMLŐSÖK KÖZÜL IS NÉHÁNY TOJÁSSAL SZAPORODIK. A MADÁRTOJÁS A MADÁREMBRIÓ FEJLŐDÉSÉT TESZI LEHETŐVÉ. A KÜLSŐ KEMÉNY, MESZES HÉJ VÉDELME T BIZTOSÍT A BENNE FEJLŐDŐ ÉLETNEK, A BELSŐ LÁGY HÉJ ALATT PEDIG A FEHÉRJE ÉS SÁRGÁJA TALÁLHATÓ, MELYEK VÉDIK ÉS TÁPLÁLJÁK A SÁRGÁJA FELSZÍNÉN FEJLŐDŐ EMBRIÓT. A MADÁRTOJÁSOK MÉRETE, SZÍNE ÉS ALAKJA IS KÜLÖNBÖZŐ.





A BOLTBAN VÁSÁROLT TYÚKTOJÁSOK MEGTERMÉKENYÍTETLENEK, AZAZ A TOJÁSBAN NINCS FEJLŐDŐ EMBRIÓ, CSUPÁN A SÁRGÁJA ÉS A FEHÉRJE. A MADARAKNÁL NEM RITKA JELENSÉG EZ. A TOJÓ HÍM NÉLKÜL IS KÉPES TOJÁST TOJNI, PERSZE ILYENKOR – HIÁBA A GONDOS KOTLÁS – A FIÓKA ELMARAD.

A FEHÉR SZÍN INKÁBB A TOJÁSAIKAT ODÚBA REJTŐ FAJOKRA JELLEMZŐ, MÍG A BARNÁS, KÉKES, ZÖLDES TOJÁSOK A KÖRNYEZETBE VALÓ BELEOLVADÁST SEGÍTIK. A TOJÁSOK LEHETNEK EGYSZÍNŰEK ÉS PÖTTYÖSEK. EZEK A MINTÁK AZ ÁLCÁZÁS MELLETT SZILÁRDÍTJÁK IS A TOJÁST. A BARNÁS FOLTOKNÁL A HÉJ ERŐSEBB, MINT A FOLT NÉLKÜLI TERÜLETEKEN.



HA TERMÉKENY A TOJÁS, A CSIBE 21 NAP ALATT KEL KI BELŐLE.



21. nap

