

1. Hány bagolyfaj tekinthető rendszeres fészkelőnek Magyarországon?

(Madártávlat – 2017/2. szám: Világpolgár madárfajok: a gyöngybagoly)

*Rendszeres fészkelőnek csak nyolc, alkalminak pedig további két bagolyfaj tekinthető.*

2. Hol találhatóak napjainkban a tűzok legjelentősebb állományai Európában?

(Madártávlat – 2017/2. szám: Tűzokvédelem – Újratöltve)

*Ma a legjelentősebb európai tűzokállomány az Ibériai-félszigeten fészkel, ezt követi a sorban a több egységből álló közép-európai populáció, amelynek súlypontja a Kárpát-medence, illetve Magyarország.*

3. Hogyan különböztethetők meg a felnőtt tengeliceknél a hím és tojó példányok?

(Madártávlat – 2017/1. szám: 2017-ben az év madara: a tengelic)

*Az öreg hím esetében a piros fejmintázat túlér a szem vonalán, az orrserték általában feketések. Az öreg tojónál a piros arcminázat nem ér túl a szem vonalán, az orrserték legtöbbször világosak.*

4. Honnan kapta nevét a pásztorgém?

(MME Csongrád Megyei Helyi Csoport: A pásztorgém első költése a szegedi Fehér-tavon)

*Kifejezetten kedveli a száraz gyepek nyújtotta rovarláplálékot, ahol főleg a legelő állatok által felriasztott egyenesszárnyúakra vadászik. Magyar nevét is e sajátos táplálkozási szokása után kapta.*

5. Mely madárfajok által készített odúkat foglalja el legszívesebben a szalakóta?

(MME Tudásbázis: Szalakóta)

*A szalakóta által választott odút többnyire a zöld küllő, kisebb részben a fekete harkály vájja.*

6. Magyarország melyik régióiban költ legnagyobb számban a haris?

(Madártávlat – 2016/1. szám: Az év madara: a haris)

*A revírek többségét É-ÉK-Magyarországon, a Bereg-Szatmári-sík, a Bodrogzug, a Bodrogek, a Hegyek, valamint a Cserehát és a Putnoki-dombság területén találjuk.*

7. Hány tojásból áll a daru fészkalja?

(MME Tudásbázis: Daru)

*Fészkalja általában két tojásból áll.*

8-9-10. Milyen hazai madárfajok láthatók a képeken?

(Fotók: Csibrány Balázs)



8. Vörös vércse (*Falco tinnunculus*)



9. Csíz (*Carduelis spinus*)



10. Kis fakopáncs (*Dendrocopos minor*)

