

1. Melyik országban található a pajzsoscankó legnagyobb európai költőállománya?

(Madártávlat 2014/2. szám: A pajzsoscankó természetrajza)

*A pajzsoscankó világállományát 2 millió „pár” körülire becsülik. Európában maximum fél millió pár költ, ezek nagyobb része Oroszországban él.*

2. Honnan kapta nevét a siketfajd?

(Madártávlat 2015/1. szám: A siketfajd természetrajza)

*A kakasok hátraszegett fejfel történő kakatolásuk során „süketekké” válnak, innen kapta e faj a magyar nevét is.*

3. Hogyan sikerült megmenteni az uhut a kipusztulástól Magyarországon?

(Madártávlat 2015/1. szám: Az MME természetvédelmi tevékenysége 5. – Az uhu védelme Magyarországon)

*Fogságban nevelt, nagyrészt külföldről hozott fiatal madarakat, összesen 141 példányt vadítottak vissza és engedtek szabadon a korábbi ismert uhu fészkelőhelyeken 1986 és 1991 között.*

4. Milyen madárfajok befolyásolják a kék vércsék hazai elterjedését és állománysűrűségét?

(Madártávlat 2014/3. szám: Kék vércsék védelme – és az MME)

*A kék vércse fészket nem épít, csak ott telepszik meg, ahol számára megfelelő fészekínálatot talál. Elterjedését és állománysűrűségét így az élőhelyi adottságokon kívül főként a vetési varjú és a szarka rendelkezésre álló fészkei alakítják.*

5. Magyarország mely tájegységein fészkel a kövirigó?

(Madártávlat 2014/3. szám: A kövirigó természetrajza)

*A kövirigónak a Vértes, a Pilis, a Budai hegyek, a Börzsöny, a Bükk területén jelentős állományai költöttek, de rendszeres fészkelő volt a tokaji és a villányi szőlőhegyeken is.*

6. Miben különbözik a kékcserű réce tojása a többi récefajétól?

(Madártávlat 2015/2. szám: A kékcserű réce természetrajza)

*A kékcserű réce testméretéhez képest – egy átlagos tojó tömege 540-640 gramm – hatalmas, 90 grammnál is nehezebb tojásokat rak. A teljes fészkealj súlya, amely átlagosan 6-9 tojásból áll, gyakran megegyezik a tojó saját testsúlyával.*

7. A búbosbanka hazánk melyik régióiban költ legnagyobb számban?

(Madártávlat 2015/1. szám: Az év madara 2015-ben: a búbosbanka)

*Az extenzíven művelt, laza, homokos területeken (pl. Kiskunság, Nyírség) és a dél-alföldi tanyavilágban még gyakori költő-fajnak számít. Máshol inkább csak szóróványosan fordul elő.*

8-9-10. Milyen hazai madárfajok láthatók a képeken?

(Fotók: Csibrány Balázs)



8. Süvöltő (*Pyrrhula pyrrhula*)



9. Pajzsoscsankó (*Philomachus pugnax*)



10. Vadgerle (*Streptopelia turtur*)

