

1. Miben különbözik a pajzsoscankó hímek és tojók vonulása?

(Madártávlat 2014/2. szám: A pajzsoscankó természetrajza)

*A tojók délebbre vonulnak, mint a hímek. Utóbbiak nagy számban telelnek a mediterrán régióban, miközben Afrikában a tojók száma akár a hímek tízszeresét is elérheti.*

2. Nagyjából mennyi ideig volt a siketfajt a hazánkban költő madárfauna része?

(Madártávlat 2015/1. szám: A siketfajd természetrajza)

*A siketfajd jelenlegi ismereteink szerint száz évig volt az Alpoknál fészkelő madarunk.*

3. Milyen természetvédelmi problémát vethet fel a jövőben az uhu állomány növekedése?

(Madártávlat 2015/1. szám: Az MME természetvédelmi tevékenysége 5. – Az uhu védelme Magyarországon)

*Az uhu, mint rendkívül erős testfelépítésű ragadozó, képes a vándor- és a kerecsensólyom, sőt a békászó sas elfogására is, ami helyenként akár problémát is jelenthet.*

4. Mely afrikai országok területén töltik a telet a hazai kék vércsék?

(Madártávlat 2014/3. szám: Kék vércsék védelme – és az MME)

*A Kárpát-medencében műholdas jeladókkal jelölt tojó kék vércsék Angola déli felén és Namíbiában töltötték a telet.*

5. Mikor és hol költött utoljára kövirigó Magyarországon?

(Madártávlat 2014/3. szám: A kövirigó természetrajza)

*Nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy az utolsó kövirigó párunk a bükki Bélkőn költött 2007-ben*

6. Miért volt sikertelen a kékcsőrű réce visszatelepítési kísérlet az 1980-as években?

(Madártávlat 2015/2. szám: A kékcsőrű réce természetrajza)

*1984 és 1986 között az Angliából származó tojásokból összesen 75 fiókát sikerült felnevelni. 1986-ban már a saját nevelésű felnőtt madarak is költeni kezdtek, de mind azok, mind az import tojások termékenysége fokozatosan romlott. Mint utólag kiderült, ennek minden bizonnyal az volt az oka, hogy az összes Slimbridge-i és az európai állatkertekben tartott kékcsőrű récék mindössze 12 – Pakisztánból származó – egyedtől származtak.*

7. A búbosbanka milyen magasságokig hatolhat fel vonulása során?

(Madártávlat 2015/1. szám: Az év madara 2015-ben: a búbosbanka)

*Vonulása során a hegységeken is átkel. Az Alpokban 2900 m, a Himalájában 6400 m tengerszint feletti magasságban is megfigyelték már.*

8-9-10. Milyen hazai madárfajok láthatók a képeken?

(Fotók: Csibrány Balázs)



8. Süvöltő (*Pyrrhula pyrrhula*)



9. Pajzsoscsankó (*Philomachus pugnax*)



10. Vadgerle (*Streptopelia turtur*)

