

1. Milyen okok vezethettek a hazai kerti sármány állomány eltűnéséhez?

(Madártávlat 2015/1. szám: A kerti sármány természetrajza)

*Az intenzív mezőgazdaság miatt lecsökkent a gyomnövények és a rovarok száma, amely táplálékul szolgál a kerti sármánynak. Sok helyen a mai napig is probléma a madarak vadászata, befogása.*

2. Miben különbözik a rózsás- és borzas gödények fészke?

(Madártávlat 2012/2. szám: Egykori fészkelő madaraink: a rózsás gödény és a borzas gödény)

*A borzas gödény valódi fészket épít, akkor is, ha szigeteken vagy fövényen a földre telepszik. Rózsás gödénnyel vegyes telepein is könnyen elkülöníthetők fészkei, mivel azok kiemelkednek a talaj síkjából.*

3. A fészektől milyen távolságra járnak el táplálékért a partifecskek a költés alatt?

(Madártávlat – 2010/1. szám: A partifecske)

*Rádiótelemetriás vizsgálatok alapján tudjuk, hogy a fiókaetelési időszakban az etető madarak a fészkelőtelepek egy kilométeres körzetén belül táplálkoznak.*

4. Hol és mikor találtak utoljára fészkelő rezneket Magyarországon?

Mint kiderült, egyesületünk honlapján két eltérő információ szerepelt a reznek utolsó költésének dátumáról, ezért az 1952-es és 1973-as költést egyaránt elfogadjuk megoldásként a faj utolsó hazai fészkelését illetően.

5. Milyen módszerekkel csökkenthető a kis kárókatona károkozása a haltenyésztés során?

(Madártávlat – 2012/3. szám: Fókuszban: a kis kárókatona)

*„Rémzsinórral” történő riasztás az ivadéknevelőkön, hosszabb ivadék-előnevelés, táplálkozóterület kialakítása, tavaszi ivadéktelepítés időzítése.*

6. Hol volt rendszeres fészkelő Magyarországon a kacagócsér a 20. század elejéig?

(Madártávlat 2013/3. szám: A kacagócsér természetrajza)

*A kacagócsér a Fertő-tó magyar oldalán egészen a 19. század második fele és a 20. század első fele között rendszeres fészkelő volt.*

7. Hogyan vészeli át a sarlósfecske fiókák a hűvös, táplálékszegény időszakot?

(Madártávlat – 2010/4. szám: A sarlósfecske)

*Gyorsan érkező időjárási frontok vagy elhúzódó hűvös, csapadékos időjárás elől az öreg madarak kitérnek. Ilyenkor költőhelyüktől jelentős távolságra – akár 50-100 kilométerre is – eltávolodhatnak. Fiókanevelés idején a fészkekben ülő fiatalok ezt az időszakot úgynevezett éhségválassal vészeli át. Ekkor előfordul, hogy az öregek napokig nem etetik őket.*

8-9-10. Milyen hazai madárfajok láthatók a képeken?

(Fotók: Csibrány Balázs)



8. Búbospacsirta (*Galerida cristata*)



9. Nagy goda (*Limosa limosa*)



10. Kőforgató (*Arenaria interpres*)

